

# Mastectomía radical

## 1- Identificación y descripción del procedimiento

Mediante este procedimiento se va a extirpar la mama y los ganglios de la axila. A veces se incluye la extirpación del musculo pectoral menor y rara vez el mayor.

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento mas adecuado.

La intervención requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la intervención sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos le informaran los servicios de Anestesia y Hematología.

## 2- Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

El objetivo del procedimiento es la curación de la enfermedad de base o, en caso, la paliación de los síntomas y aumento de la calidad de vida. Este procedimiento pretende la extirpación de la mama enferma evitando la extensión de la enfermedad a los tejidos de alrededor y a distancia.

## 3- Alternativas razonables a dicho procedimiento

La mejor alternativa terapéutica es la cirugía. En caso de rechazo a la cirugía, el tratamiento puede incluir quimioterapia, radioterapia u hormonoterapia.

## 4- Consecuencias previsibles de su realización.

La curación de la enfermedad o la paliación de los síntomas y/o signos.

## 5- Consecuencias previsibles de la no realización.

La progresión de la enfermedad con deterioro del paciente, incluso en su caso con tendencia hacia la muerte.

## 6- Riesgos frecuentes.

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables.

Son tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento:

- Infección o sangrado de la herida, colección de líquido en la herida, flebitis, edema transitorio del brazo, cicatrices retractiles, dolor prolongado en la zona de la operación.

## 7- Riesgos poco frecuentes

Existen otros riesgos que pueden ser mas graves aunque son poco frecuentes:

- Inflamación grave de los linfáticos del brazo, reproducción de la enfermedad, sangrado importante, alteraciones locales de los nervios.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento medico (medicamentos, sueros, etc.), pero pueden llegar a requerir una re intervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo mínimo de mortalidad.

## 8- Riesgos en función de la situación clínica personal del paciente.

Por parte del paciente, es necesario advertir de sus posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

Por la situación vital actual del paciente (diabetes, obesidad, hipertensión, anemia, edad avanzada,...) puede aumentar la frecuencia o la gravedad de riesgos asociados a estas enfermedades como dehiscencia de suturas, las infecciones, los accidentes cerebro-vasculares, la disnea, las embolias, etc.

**DECLARACION DE CONSENTIMIENTO**

Don/Doña.....  
de.....años, con D.N.I. Nº..... y con domicilio en .....

Don/Doña.....con D.N.I Nº..... y domicilio en..... en calidad de (representante legar, familiar o allegado de la paciente).....con DNI....., Declaro:

Que el Doctor/a.....me ha explicado que es conveniente/necesario, en mi situación la realización de ..... Y que ha comprendido adecuadamente la información que me ha dado

En ..... de ..... de .....

**Fdo.: D/Dña..... DNI.....**

**Fdo.: D/Dña..... Colegiado Nº:.....**

**REVOCACION DEL CONSENTIMIENTO**

Revoco el consentimiento prestado en fecha.....de.....de 2..... y no deseo proseguir el tratamiento que doy con esta fecha por finalizado.

En ..... de ..... de .....

**Fdo.: el médico  
Colegiado Nº:.....**

**Fdo.: el/la paciente.**