

Tratamiento quirúrgico de tumorectomía de mama

1. Identificación y descripción del procedimiento

Mediante este procedimiento se va a extirpar la lesión de la mama. El resultado intra o postoperatorio de la biopsia puede indicar la necesidad de ampliar la resección a los ganglios de la axila e incluso toda la mama. Cabe la posibilidad que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios para proporcionar el tratamiento más adecuado.

La intervención requiere la administración de anestesia y es posible que durante o después de la misma sea necesaria la ubicación de sangre y/o hemoderivados, de cuyos riesgos informarán los servicios de Anestesia y de Hematología.

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

El procedimiento pretende la extirpación de la lesión de la mama para su estudio anatomopatológico.

La intervención permitirá el diagnóstico definitivo y evitar el eventual progreso de la enfermedad.

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento

No existe una alternativa terapéutica eficaz para la extirpación de la lesión y su estudio anatomopatológico completo.

4. Consecuencias previsibles de su realización

La intervención tiene por objetivo la curación de la enfermedad o el tratamiento de los síntomas que produce.

5. Consecuencias previsibles de la no realización

La no realización de la intervención conlleva el riesgo de progreso de la enfermedad, y que su posterior realización requiera una intervención de mayor envergadura y menor alcance terapéutico.

6. Riesgos frecuentes

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que puedan afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento.

Se pueden producir complicaciones que son poco graves y frecuentes:

- Infección o sangrado de la herida quirúrgica, colección de líquido en la herida, flebitis, edema transitorio del brazo, cicatrices retráctiles, disminución del volumen de la mama, o dolor prolongado en la zona de la operación.

7. Riesgos poco frecuentes

Otros riesgos son menos frecuentes, pero pueden ser más graves:

- Inflamación grave de los linfáticos del brazo, recidiva de la enfermedad, sangrado importante, alteraciones locales de los nervios.

