



## Documento de consentimiento informado para la intervención quirúrgica de cirugía menor

Pegatina con los datos personales y de identificación del niño a intervenir

Don/Doña \_\_\_\_\_  
con DNI número \_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_ del niño  
\_\_\_\_\_, con la Historia Clínica nº \_\_\_\_\_

### DECLARO

Que el Dr. /Dra. \_\_\_\_\_ me ha informado de la necesidad de utilizar un procedimiento de cirugía menor para tratar la patología que sufre mi hijo/a, consistente en una \_\_\_\_\_

1. El propósito principal de la intervención es la extirpación de la lesión, su reparación o la ejecución de otro procedimiento quirúrgico.
2. La intervención precisa anestesia local, loco-regional o general, según la edad del niño y las características de la lesión. De utilizar anestesia general, será informado/a por el Servicio de Anestesiología y Reanimación. Habitualmente es una intervención que se realiza en régimen ambulatorio (CMA)
3. La intervención consiste en tratar la lesión (drenaje, extirpación total o parcial, sutura de herida) o realizar otro tipo de intervención similar.
4. Basándose en los hallazgos quirúrgicos, o de surgir algún imprevisto, el equipo medico podrá modificar la técnica quirúrgica programada y decidir la opción terapéutica mas adecuada.
5. La consecuencia de esta intervención será la extirpación parcial o completa de la lesión a tratar con la realización de una sutura dérmica, que dejara una cicatriz en el sitio de la lesión. La lesión extirpada se remitirá para su estudio anatomopatológico, si fuere pertinente.
6. A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables específicos del procedimiento:
  - Poco graves y frecuentes: infección o hematoma de la herida quirúrgica, intolerancia al material de sutura, absceso o apertura de la sutura, lesiones cutáneas por reacción alérgica a la medicación utilizada, cicatrices retractiles o antiestéticas, molestias locales, dolor prolongado en la zona de la operación o recidiva de la lesión, en su caso.
  - Graves y poco frecuentes: reacción alérgica grave a los anestésicos locales, que puede llegar a producir shock anafiláctico. Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento medico específico, pero pueden llegar a requerir una reintervención.
7. En cualquier caso, pese a la adecuada elección de la técnica, toda intervención quirúrgica pediátrica, tanto por la propia técnica como por las peculiaridades clínicas específicas de cada niño. Lleva implícita una serie de posibles complicaciones comunes y potencialmente serias (infección, hemorragia, dolor), que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.
8. Los riesgos personalizados por las características de su hijo son: \_\_\_\_\_
9. Se puede utilizar parte de los tejidos obtenidos con carácter científico, en ningún caso comercial, salvo que yo manifieste lo contrario.
10. La realización del procedimiento podrá ser filmada con fines científicos o docentes, salvo que yo manifieste lo contrario, sin que ello comporte ningún riesgo para la salud de mi hijo.

