

Documento de consentimiento informado para la intervención quirúrgica de fimosis

PEGATINA CON LOS DATOS
PERSONALES Y DE IDENTIFICACIÓN DEL
NIÑO A INTERVENIR

Don/Doña _____
con DNI número _____ en calidad de _____ del niño
_____, con la Historia Clínica nº _____

DECLARO

Que el Dr. /Dra. _____ me ha informado de la necesidad de intervenir la fimosis que padece mi hijo, practicándole una circuncisión.

1. El propósito principal de la intervención es conseguir bajar la piel del prepucio para descubrir el glande, realizar una higiene normal del pene y poder mantener unas relaciones sexuales satisfactorias en el futuro.
2. La intervención precisa anestesia local o general en función de la edad y colaboración del niño, recomendándose la anestesia general por debajo de los 9-10 años, que será informada por el servicio de Anestesiología y Reanimación.
3. La intervención se denomina circuncisión y consiste en eliminar la parte estrecha del prepucio que dificulta las maniobras para descubrir el glande. La recuperación es buena, aunque en las primeras horas del postoperatorio el niño puede notar dificultad al orinar, pero en general puede volver a su actividad habitual e un plazo corto de tiempo. Puede intervenir en régimen de cirugía mayor ambulatoria.
4. Las posibles alternativas son la aplicación de pomadas tópicas de corticoides, con una eficacia limitada; la realización de manipulaciones locales que produzcan dilatación del prepucio; y demorar la intervención hasta que se pueda realizar con anestesia local manteniendo una higiene adecuada.
5. Dada las características del proceso, basándose en los hallazgos quirúrgicos, o de surgir algún imprevisto, el equipo médico podrá modificar la técnica quirúrgica programada y decidir la opción terapéutica más adecuada.
6. La consecuencia de esta intervención será la ausencia (total o parcial) del prepucio resecaado.
7. Las complicaciones más frecuentes de la intervención informada pueden ser dolor y vómitos en las primeras horas, hematoma, edema prepucial transitorio y aparición de escaras, que se resuelven con el tratamiento local, baños de asiento, etc... en los días siguientes. Otras complicaciones mucho menos frecuentes son las heridas del glande, lesión uretral con aparición de fistulas, y fibrosis cicatricial, que pueden exigir tratamientos específicos. En algunos casos, con refección parcial del prepucio, pueden existir recidivas de la fimosis, pudiendo cerrarse de nuevo el anillo y precisar nueva intervención.
8. En cualquier caso, pese a la adecuada elección de la técnica, toda intervención quirúrgica pediátrica, tanto por la propia técnica como por las peculiaridades clínicas específicas de cada niño, lleva implícita una serie de posibles complicaciones comunes y potencialmente serias (infección, hemorragia, dolor), que podrían requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.
9. Los riesgos personalizados por las características de su hijo son: _____
10. Se puede utilizar parte de los tejidos obtenidos con carácter científico, en ningún caso comercial, salvo que yo manifieste lo contrario.
11. La realización del procedimiento podrá ser filmada con fines científicos o docentes, salvo que yo manifieste lo contrario, sin que ello comporte ningún riesgo para la salud de mi hijo.
12. Declaro haber recibido la información sobre la intervención de fimosis de forma clara, fehaciente y ajustada a mis conocimientos, haberla entendido, aclarado dudas, y valorado los posibles riesgos subyacentes a la intervención descrita, tomando la decisión de acuerdo con mi propia y libre voluntad, que podre revocar en cualquier momento.

