



2.- No es frecuente pero, a consecuencia de la manipulación quirúrgica del cerebro y de los vasos, se pueden producir hemorragias o infartos que serán más o menos graves según sea su extensión y localización.

3.- Los riesgos de infección no son habituales, pero ésta puede afectar sólo a la piel o también al hueso y al cerebro. Si no se soluciona con antibióticos a veces es necesaria otra intervención.

4.- Según sea la zona donde se localice la lesión y el tipo de malformación vascular, puede que al realizar la intervención haya que extirpar una parte del hueso, quedando un defecto estético. Si el defecto es grande, a veces puede ser necesaria otra intervención para poder cubrirlo utilizando una prótesis.

5.- Para sujetar la cabeza durante la intervención se coloca un soporte especial que se fija al cráneo por tres pinchos. Puede haber una infección o un hematoma local en estas zonas.

No es frecuente y si sucede no suele dar complicaciones.

6.- Al estar la lesión en el cerebro, puede que en el postoperatorio aparezcan crisis convulsivas o ataques epilépticos a pesar de que demos una medicación específica para evitarlo.

7.- A pesar de todas las medidas de tratamiento, a veces se produce un edema cerebral o "hinchazón" que puede impedir continuar con la intervención y provocar una evolución desfavorable y grave.

8.- Es muy infrecuente que ocurra desplazamiento o rotura de los clips que se colocan para cerrar los vasos.

9.- Si la intervención se realiza en la parte posterior del cráneo (fosa posterior, donde se sitúa el cerebelo y el tronco cerebral) tiene una serie de riesgos específicos:

- Esta intervención es frecuente que se tenga que realizar con el paciente en posición sentada. Existen entonces riesgos de que entre aire en las venas de la cabeza ocasionando una embolia gaseosa. No es habitual, pero si sucede es una complicación grave.

- En esta zona es difícil hacer un cierre hermético de la membrana que cubre al cerebro por lo que a veces se produce salida del líquido cefalorraquídeo, con el riesgo que supone de infección. A veces es necesaria otra intervención para corregir el cierre.

- Los nervios que se pueden lesionar con más frecuencia son los que afectan a los movimientos de la cara, los ojos, la lengua... Se puede producir pérdida de audición, dificultad para tragar alimentos, para pronunciar palabras... Todo lo anterior dependerá del tipo de lesión y su localización.

- Esta zona se encuentra cerca del tronco cerebral que regula la respiración y la frecuencia cardíaca. Es excepcional que suceda una lesión a este nivel, pero si esto ocurre es una complicación muy grave.

10.- A pesar de utilizar heparinas profilácticas a veces se pueden producir trombosis de las piernas y más excepcionalmente embolias pulmonares.

11.- Si antes de ser intervenido tiene una parálisis de un nervio o de una extremidad, dificultad para hablar... no le podemos garantizar que con la intervención se recupere.

Todo dependerá del tipo de lesión, localización y tiempo de evolución.

12.- Reacciones alérgicas (Tanto el INSALUD, como Sociedades científicas especializadas recomiendan el no hacer sistemáticamente pruebas diagnósticas para detectar una posible alergia, ya que las mismas pruebas no están exentas de riesgos y el resultado negativo no garantiza que no exista reacción alérgica posterior). *Si tiene antecedentes alérgicos comuníquenoslo.*

13.- RIESGOS PARTICULARES: .....  
õ ..

El **abajo** **firmante**  
D/Dña.....  
de.....años de edad, o por incapacidad legal su representante

..... **con**

**DNI..... reconoce haber sido informado de forma clara y sencilla de los detalles sobre el procedimiento al que voluntariamente se va a someter, del pronóstico, secuelas y otras consecuencias derivadas del mismo, así como de los posibles procedimientos alternativos, si los hubiere, con sus efectos y riesgos, y de haber recibido respuestas satisfactorias a todas las preguntas que hubiere formulado.**

**Por tanto da libremente su consentimiento al médico y al Hospital para la realización de la intervención de *CRANEOTOMIA POR ANEURISMA O MALFORMACION VASCULAR* asumiendo la posibilidad de que puedan ocurrir las complicaciones explicadas u otras aún más excepcionales, sin que medie error, impericia u omisión.**

**Asimismo autorizo a mis médicos a tomar las medidas que estimen oportunas en beneficio de mi salud que, por la urgencia de las mismas, no permitan demora para solicitar nuevo consentimiento, incluyendo: la hemoterapia (lo que implica que puede ser portadora de enfermedades transmisibles en muy baja frecuencia, a pesar de que cada donación es analizada exhaustivamente), sueroterapia, variaciones de la anestesia, técnicas instrumentales diagnósticas o terapéuticas.**

**Autorizo a que el Hospital disponga de los tejidos y otros elementos de mi cuerpo que precisan ser extirpados durante la intervención, para su oportuno estudio anatómo-patológico. Así como que puedan ser empleados en futuros estudios de investigación médica, guardando el correspondiente secreto médico sobre su procedencia.**

**Doy mi consentimiento para la observación de mi intervención por personal relacionado con la medicina, por razones docentes. De igual**

