

Intervención de biopsia prostática

1. Identificación y descripción del procedimiento

Consiste en la obtención de pequeños fragmentos de la próstata con una aguja especial para su posterior análisis en el Servicio de Anatomía Patológica, y poder diferenciar entre enfermedades benignas de aquellas que no lo son.

La exploración se realiza local pinchando a través del recto o bien en el periné (zona situada entre los testículos y ano). Se introducen una sonda de ultrasonidos por vía rectal para visualizar la próstata. Con una aguja fina de biopsia se punciona la próstata y en ocasiones tejidos de alrededor de la próstata (vesículas seminales).

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

Determinar si existe o no un cáncer de próstata.

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento

Los marcadores prostáticos y las exploraciones radiológicas y ecográficas son complementarias.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Tras el análisis los especialistas podrán determinar si tiene o no un cáncer de próstata.

5. Consecuencias previsibles de su no realización

En su situación actual, el facultativo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles. No obstante y dado que ha recibido cumplida información, usted es en último término libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó o de sus enfermedades de base. Las posibles complicaciones que en un futuro puedan acaecer y su alcance, son en buena parte imprevisibles, incluyendo el riesgo vital.

6. Riesgos

De dicha intervención es posible pero no frecuente, esperar los siguientes efectos secundarios o complicaciones:

- **Complicaciones generales:** reacciones alérgicas al anestésico local, que pueden llegar a producir shock anafiláctico, de graves consecuencias (incluida la muerte). Sepsis (infección generalizada).
- **Complicaciones locales:** hematoma en la zona de intervención. Hematuria (sangre en la orina). Infección o dificultad miccional. Uretrorragia (aparición de sangre por el orificio uretral). Rectorragias (aparición de sangre por el ano).

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente

Es necesario que nos informe de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardio-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio.

