

Cirugía de incurvación de pene

1. Identificación y descripción del procedimiento

El pene puede estar incurvado de una forma anormal desde el nacimiento (incurvación congénita) o se desarrolla en la edad adulta motivado por una placa fibrosa en el pene (enfermedad de Peyronic). Esta incurvación hace que el paciente tenga dolor durante la erección y/o no pueda tener relaciones sexuales satisfactorias.

El tratamiento de la incurvación congénita es exclusivamente quirúrgico. El tratamiento de la incurvación del adulto puede ser con pastillas, con inyecciones en el pene, ambos de escasos resultados; o mediante cirugía, con anestesia locorregional o general, en el que se colocan unos puntos en el lado contrario a la incurvación o un injerto de otro tejido en el mismo lado de la incurvación

2. Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

Enderezamiento del pene.

Mejoría de la capacidad para tener relaciones sexuales.

3. Alternativas razonables a dicho procedimiento

Vitamina E, Tamoxifen, Antiinflamatorios vía oral, que prácticamente están abandonados por su falta de efectividad. Inyecciones en la placa fibrosa del pene cuando tiene dolor.

4. Consecuencias previsibles de su realización

Además de las ya descritas en los apartados uno y dos de este documento. De esta intervención es seguro que usted:

- Observará discreto acortamiento de la longitud del pene
- Se notará los puntos de sutura.

5. Consecuencias previsibles de la no realización

En su situación actual, el facultativo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles. No obstante y dado que ha recibido cumplida información, usted es en último término libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó de de sus enfermedades de base. Las posibles complicaciones que en un futuro puedan acaecer y su alcance, son en buena parte imprevisibles, incluyendo el riesgo vital.

6. Riesgos

De dicha intervención es posible pero no frecuente esperar los siguientes efectos secundarios o complicaciones:

- Persistencia de las molestias en el pene
- Neuralgias (dolores nerviosos), hiperestésias (aumento de la sensibilidad) o hipoestésia (disminución de la sensibilidad)
- Hinchazón o necrosis del prepucio (piel que recubre el glande)
- Disminución de la capacidad para mantener la erección

- Erección prolongada tras la cirugía que requiera tratamiento invasivo
 - Infección de la herida que podría ocasionar defectos estéticos
- De los riesgos anestésicos será informado por el Servicio de Anestesia.

7. Riesgos en función de la situación clínica del paciente:

Es necesario que nos informe de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardo-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio. Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo quirúrgico general es mayoría.

9. Declaración de consentimiento

Don/Doña _____
 de _____ años de edad, con domicilio en _____,
 DNI _____

Don/Doña _____
 de _____ años de edad, con domicilio en _____,
 en calidad de (representante legal, familiar o allegados de la
 paciente) _____ .con DNI _____

Declaro:

Que el Doctor/a _____ me
 ha explicado que es convenientemente/necesario, en mi situación la realización
 de _____ ..

En _____ .a _____ .de _____ de _____ .20

Fdo.: Don/Doña _____ DNI _____

Fdo.: Dr/Dra _____ DNI _____
 Colegiado nº: _____ ..

Revoco el consentimiento prestado en fecha _____ de _____ y no deseo
 proseguir el tratamiento que doy con esta fecha por finalizada.

En _____ .a _____ .de _____ de _____ .20

Fdo. el médico
 Colegiado nº: _____

Fdo. el/la paciente
 DNI _____