

Intervención de litiasis vesical

1- Identificación y descripción del procedimiento

Procedimiento consistente en eliminar los cálculos vesicales, mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones producidas por estos o patologías asociadas.

2- Objetivo del procedimiento y beneficios que se esperan alcanzar

El principal objetivo es la desaparición de la litiasis.

3- Alternativas razonables a dicho procedimiento

Intento de colocar un catéter endoscópicamente por la uretra.

4- Consecuencias previsibles de su realización.

La mejora de los síntomas y la prevención de complicaciones producidas por esta u otras patologías asociadas.

5- Consecuencias previsibles de la no realización.

En su situación actual, el facultativo considera la presente indicación como la mejor opción entre las posibles. No obstante y dado que ha recibido cumplida información, usted es el último término libre de aceptarla o no.

En caso de no aceptar la presente indicación debe saber que existe una elevada probabilidad de persistencia y/o progresión de la sintomatología por la que consultó o de sus enfermedades de base. Las posibles complicaciones que en un futuro puedan acaecer y su alcance, son en buena parte imprevisibles, incluyendo el riesgo vital.

6- Riesgos

De dicha intervención es posible pero no frecuente esperarlos siguientes efectos secundarios o complicaciones:

- Imposibilidad de llevar a cabo la extracción de la litiasis.
- Perforación de un asa intestinal, con el consiguiente riesgo de peritonitis.
- Hemorragia incoercible tanto en el acto quirúrgico como en el postoperatorio. Las consecuencias de dicha hemorragia son muy diversas dependiendo del tipo de tratamiento que haya de necesitarse, oscilando desde una gravedad mínima hasta la posibilidad cierta de muerte, como consecuencia directa del sangrado o por efectos secundarios de los tratamientos empleados.
- Problemas y complicaciones derivados de la herida quirúrgica:
 1. Infección en sus diferentes grados de gravedad.
 2. Dehiscencia de sutura (apertura de la herida) que puede necesitar una intervención secundaria.
 3. Fístulas temporales o permanentes.
 4. Defectos estéticos derivados de alguna de las complicaciones anteriores o procesos cicatrizantes anormales.
 5. Intolerancia a los materiales de sutura que puede llegar incluso a la necesidad de reintervención para su extracción.
 6. Neuralgias (dolores nerviosos), hiperestésias (aumento de sensibilidad) o hipoestésias (disminución de la sensibilidad).

7- Riesgos en función de la situación clínica personal del paciente.

Es necesario que nos informe de las posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardio-pulmonares, renales, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia que pudiera complicar la intervención o agravar el postoperatorio. Por su situación actual (diabetes, obesidad, inmunodepresión, hipertensión, anemia, edad avanzada...) puede aumentar la frecuencia o gravedad de riesgos o complicaciones, por lo que el riesgo quirúrgico general es mayor.

