hm hospitales

Consentimiento informado para la inyección intracavernosa

Nº Historia:.....

Don/Doña :..... de .....años de edad, con
(Nombre y dos apellidos)

domicilio en ..... .y DNI Nº.....

Don/Doña :..... de .....años de edad, con
(Nombre y dos apellidos)

domicilio en ..... .y DNI Nº.....

en calidad de ..... de Don/Doña:.....
(Representante legal, familiar o allegado) (Nombre y dos apellidos de la paciente)

Declaro

Que el DOCTOR/A.....
(Nombre y dos apellidos del facultativo que proporciona la información)

Me ha explicado que es conveniente proceder, en mi situación, a tratamiento quirúrgico de INYECCIÓN INTRACAVERNOSA.

1. Mediante este procedimiento se pretende ayudar al diagnóstico sobre las posibles alteraciones causantes de la impotencia y conseguir una erección satisfactoria.

   La realización del procedimiento puede ser filmada con fines científicos o didácticos.

2. Mediante esta técnica se determina qué tipo de alteración (vascular, neurológica, etc.) me provoca la impotencia, y de este modo se obtiene la indicación más adecuada para su corrección.

   La disfunción eréctil o impotencia requiere para su diagnóstico la realización de una serie de pruebas analíticas, clínicas y radiológicas. Una de estas pruebas es la inyección intracavernosa de sustancias (vasoactivas) que provocan una erección del pene. Esto mismo, en algunos pacientes, se indica también como tratamiento de la impotencia.

3. Comprendo que a pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como otros específicos del procedimiento como presencia de hemorragia y hematoma bajo la piel del pene, dolor en la zona de inyección, hipotensión y episodio de mareo secundario a la bajada tensional, erección permanente, que es la complicación más frecuente. Si este cuadro se prolonga más de 4 (cuatro) horas, es preciso que acuda al servicio de Urgencias de un Hospital para ser valorado por un Urólogo.

   El médico me ha explicado que estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, suerosé), pero pueden llegar a requerir una intervención, generalmente de urgencia, incluyendo un riesgo de mortalidad.

4. El médico me ha explicado que para la realización de esta técnica puede ser necesaria una preparación previa, en ocasiones con peculiaridades como é é é

é é é