

Documento de consentimiento informado dilatación y prótesis de tubo digestivo

Nombre del paciente
N. Historia Clínica
Nombre del médico que le informa

INFORMACIÓN GENERAL

La dilatación y/o colocación de una prótesis en tubo digestivo es una intervención con la que se intenta solucionar la estrechez en el estomago, el duodeno o el intestino delgado que usted padece y que impide que puedan pasar los alimentos. El tipo de anestesia requerida será la indicada por los médicos especialistas. Es posible que, durante o después de la intervención, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. Es muy importante que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

EN QUÉ CONSISTE LA DILATACIÓN Y PRÓTESIS DE TUBO DIGESTIVO

Se le introducirá, a través de la boca, un tubo (catéter) para pasar la zona estrechada que dificulta el paso de los alimentos. A continuación se le dilatará o se le colocará una prótesis que le mantendrá abierta esa zona. La duración de la intervención será, aproximadamente, de una hora. Se podrá utilizar sedación para evitarle molestias. También cabe la posibilidad de que durante la intervención haya que realizar modificaciones de la misma, por los hallazgos encontrados, para proporcionar un tratamiento más adecuado.

En esta intervención se utilizará un medio de contraste que contiene yodo. Si usted ha presentado anteriormente alergia a este tipo de contraste debe advertirlo para tomar las medidas oportunas.

RIESGOS DE LA DILATACIÓN Y PRÓTESIS DE TUBO DIGESTIVO

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, etc), y los específicos del procedimiento.

Los beneficios que se pretenden conseguir con esta intervención superan los posibles riesgos que a continuación le exponemos:

Por el medio de contraste:

Reacciones alérgicas, que pueden ser:

- Leves: náuseas, vómitos, picores o urticaria.
- Raramente graves: dificultad para respirar, arritmias, alteraciones de los riñones.
- Excepcionalmente, la muerte (1 de cada 100.000 pacientes).

Por la técnica que vamos a realizar:

- Dolor, que habitualmente cede con analgésicos.
- Sangrado o hemorragia leve en el tubo digestivo, que normalmente cede sola y no necesita tratamiento.
- Raras veces se puede producir una hemorragia más importante que requiera tratamiento urgente.
- Desplazamiento de la prótesis que le hemos colocado, que en algún caso podría requerir tratamiento adicional.
- Obstrucción de la prótesis, lo que podría requerir una intervención.
- Infección del pulmón (neumonía por aspiración)
- Excepcionalmente, puede producirse perforación del tubo digestivo produciendo una inflamación en el abdomen (peritonitis), lo que precisaría una intervención quirúrgica urgente.

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc.) pero pueden llegar a requerir una intervención, en algunos casos de urgencia. Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.

Por las características de esta intervención, puede tener una probabilidad de riesgo asociado al uso de radiaciones ionizantes.

De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de este Centro están disponibles para intentar solucionarla.

RIESGOS PERSONALIZADOS

Fecha de Aplicación: Junio 2015 Rev. 2

QUÉ OTRAS ALTERNATIVAS HAY

En la actualidad, la alternativa sería la intervención quirúrgica.

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene alguna duda, por favor, no dude en preguntar al médico especialista responsable.

Firma:	Firma:		Firma:
de Colegiado: D.N	I.I.:	 D.N.I	.: Nº
MÉDICO INFORMANTE:	PACIENT	E (O REPRESENTANTE LEGAL):	TESTIGO:
En	, a	_ de	de
haciéndome responsable de las			
la naturaleza y riesgos del pi REVOCACIÓN de consentimien			
D/Dña	ro o o directore t	o propulate manificate de	_después de ser informado/a de
	REVOCACI	ÓN DE CONSENTIMIENTO	
Firma:	Firma:		Firma:
de Colegiado: D.N		D.N.I	:
MÉDICO INFORMANTE:	PACIENT	TE (O REPRESENTANTE LEGAL):	TESTIGO:
En	, a	_ de	de
la naturaleza y riesgos del pr DENEGACIÓN para su realizació de esta decisión.	n, haciéndo	ome responsable de las consec	uencias que puedan derivarse
D/Dña		ÓN DE CONSENTIMIENTO	_después de ser informado/a de
Firma:	Firma:		Firma:
de Colegiado: D.N		D.N.I	
MÉDICO INFORMANTE:	PACIENT	E (O REPRESENTANTE LEGAL):	TESTIGO:
En	, a	_ de	de
Estoy satisfecho con la informa consentimiento sin que precise o asistencia recibida.			
CONSENTIMIENTO para que mo			
Yo, D/Dña	!:		doy mi
L	DECLARAC	ION DE CONSENTIMIENTO	