

# Documento de consentimiento informado recanalización de fístula de hemodiálisis

Nombre del paciente	
N. Historia Clínica	
Nombre del médico que le informa .	

# INFORMACIÓN GENERAL

La recanalización es una intervención con la que intentamos solucionar el problema de funcionamiento de su fístula para hemodiálisis. El tipo de anestesia requerida será la indicada por los médicos especialistas. Es posible que, durante o después del procedimiento, sea necesaria la utilización de sangre y/o hemoderivados. Es muy importante que advierta de posibles alergias medicamentosas, alteraciones de la coagulación, enfermedades cardiopulmonares, existencia de prótesis, marcapasos, medicaciones actuales o cualquier otra circunstancia.

## EN QUÉ CONSISTE LA RECANALIZACIÓN DE FÍSTULA DE HEMODIÁLISIS

Se le pinchará un vaso, generalmente en el brazo de la fístula o en la ingle, utilizando anestesia local. A continuación se introducirá un tubo (catéter) que llegará a la zona obstruida de la fístula, para aplicarle, en ese lugar, el procedimiento que pueda resolver la obstrucción. Se inyectará un líquido (medio de contraste) a través del tubo, lo que nos permitirá ver sus venas y llevar a cabo la intervención. Le podremos resolver la obstrucción de los vasos de su fístula de hemodiálisis por uno o varios de estos métodos: dilatándole la estrechez mediante un catéter-balón, colocándose una prótesis (stent) para que la vena permanezca abierta, disolviéndole el coágulo de sangre mediante agentes químicos (fibrinolisis) o bien, aspirándole el coágulo por medios mecánicos. Esta intervención durará, aproximadamente, una hora. Se podrá utilizar sedación para evitarle molestias durante la misma. También cabe la posibilidad de que durante la intervención haya que realizar modificaciones de la misma, por los hallazgos encontrados, para proporcionar un tratamiento más adecuado. Por la naturaleza de su enfermedad es frecuente tener que repetir este procedimiento a lo largo del tiempo, para mantener un funcionamiento adecuado de la fístula.

En esta intervención se utilizará un medio de contraste que contiene yodo. Si usted ha presentado anteriormente alergia a este tipo de contraste debe advertirlo para tomar las medidas oportunas.

# RIESGOS DE LA RECANALIZACIÓN DE FÍSTULA DE HEMODIÁLISIS

A pesar de la adecuada elección de la técnica y de su correcta realización, pueden presentarse efectos indeseables, tanto los comunes derivados de toda intervención y que pueden afectar a todos los órganos y sistemas, como los debidos a la situación vital del paciente (diabetes, cardiopatía, hipertensión, edad avanzada, anemia, obesidad, etc), y los específicos del procedimiento.

Los beneficios que se pretenden conseguir con esta intervención superan los posibles riesgos que a continuación le exponemos:

#### Por el medio de contraste:

Reacciones alérgicas, que pueden ser:

- Leves: náuseas, vómitos, picores o urticaria.
- Raramente graves: dificultad para respirar, arritmias, alteraciones de los riñones.
- Excepcionalmente, la muerte (1 de cada 100.000 pacientes).

## Por la técnica que vamos a realizar:

- Se puede producir un coágulo (trombo) en el vaso que se pincha.
- Sangrado por el sitio de punción (hematoma).
- Lesión del vaso sanguíneo que estamos tratando (trombosis, disección, rotura) lo que puede ocasionar complicaciones graves y requerir intervención urgente.
- Puede soltarse un coágulo y obstruir un vaso a distancia (embolia).

Estas complicaciones habitualmente se resuelven con tratamiento médico (medicamentos, sueros, etc) pero pueden llegar a requerir una intervención, en algunos casos de urgencia. Ningún procedimiento invasivo está absolutamente exento de riesgos importantes, incluyendo el de mortalidad, si bien esta posibilidad es bastante infrecuente.

Por las características de esta intervención, puede tener una probabilidad de riesgo asociado al uso de radiaciones ionizantes

De cualquier forma, si ocurriera una complicación, debe saber que todos los medios técnicos de este Centro están disponibles para intentar solucionarla.

RIESGOS PERSONALIZAD	OS	
		-
OHE OTRAC ALTERNATIV	/AC HAV	-
QUE OTRAS ALTERNATIV		
	sería la cirugía directa sobre la fístula mediante inte	. •
médico especialista responsab	o, si desea más información o tiene alguna duda, po le.	r ravor, no dude en preguntar ar
	DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO	
Yo, D/Dña		doy mi
CONSENTIMIENTO para qu	ie me sea realizada la RECANALIZACIÓN DE F	ISTULA DE HEMODIALISIS.
	ormación recibida, he aclarado mis dudas y ise dar ninguna razón, y sin que ello suponga u	
En	, a de	de
MÉDICO INFORMANTE:	PACIENTE (O REPRESENTANTE LEGAL):	TESTIGO:
N⁰ de Colegiado:	D.N.I.:	D.N.I.:
Firma:	Firma:	Firma:
DENEGACIÓN para su realiz de esta decisión.	el procedimiento propuesto, manifiesto de fo zación, haciéndome responsable de las consec , a de	uencias que puedan derivarse
MÉDICO INFORMANTE:	PACIENTE (O REPRESENTANTE LEGAL):	TESTIGO:
Nº de Colegiado:	D.N.I.:	D.N.I.:
Firma:	Firma:	Firma:
REVOCACIÓN de consentin haciéndome responsable de	REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO  el procedimiento propuesto, manifiesto de formiento para su realización, prestado en fecha e las consecuencias que puedan derivarse de elemento, a de	esta decisión de
Nº de Colegiado:	D.N.I.:	D.N.I.:
Firma:	Firma:	Firma:

Fecha de Aplicación: Junio 2015 I-GHM-DG-10/582