

Consentimiento informado reconstrucción cervical con colgajos libres

Nombre y apellidos del paciente

DNI

D./Dña. (*Representante legal, familiar o allegado*),.....

DNI

Nombre y apellidos del médico que informa

Nº de colegiado

¿Qué le vamos hacer?

1. Descripción del procedimiento

En que consiste: Es trasladar tejidos de su propio cuerpo como la piel, músculo, nervio, fascia, tendón o en general una combinación de ellos, con sus vasos nutrientes desde una zona del cuerpo a la dañada para su reparación por la pérdida de sustancia que ha dejado expuestos tendones, nervios, vasos, hueso...

Cómo se realiza: Bajo anestesia general se suturan los tejidos mediante técnicas micro quirúrgicas.

Cuánto dura: Variable, pero normalmente superior a 5-6 horas, siempre dependiendo de la extensión y complejidad del tratamiento quirúrgico que deba ser aplicado.

2. Qué objetivo persigue: Cobertura de las lesiones y mejorar la función de la región cervical.

¿Qué riesgos tiene?

1. Riesgos generales:

Aparte de los riesgos derivados de la anestesia general. Los riesgos de este tipo de intervención son:

Poco frecuente o poco grave:

- Cicatrices en las zonas donantes.
- Aparición de una zona de anestesia (pérdida de sensibilidad) en las zonas donantes, en los bordes de la cicatriz.
- Si los despegamientos y traslados de tejidos son grandes, se puede producir seromas (acúmulo de líquido) que pueden necesitar drenarlos.
- Hematomas, que generalmente desaparecen con el tiempo.
- Dehiscencias de suturas superficiales que dan lugar a cicatrices ensanchadas.

Poco frecuente y grave:

- Al realizar suturas en vasos de muy pequeño calibre, puede ocurrir trombosis (oclusión) que puede precisar cirugía para retirar el trombo y rehacerlas o bien limpiar el hematoma en la zona de la sutura vascular.
- Necrosis parciales o totales de los colgajos por mala irrigación de los tejidos; que puede requerir nuevas técnicas reparadoras, pudiendo llegar a dejar un faringostoma permanente si se han agotado todas las posibilidades reparadoras.
- En el caso de reconstrucción de fístula faringocutánea puede reaparecer hasta en un 15% de los casos, en especial si ha recibido radioterapia.
- Infección tanto de las suturas vasculares, como de las superficiales.

2. Riesgos personalizados:

Además de los riesgos anteriormente citados por la/s enfermedad/es que padece puede presentar otras complicaciones.....

Los enfermos fumadores tienen más riesgo de trombosis vascular y de cicatrices insatisfactorias.

3. Beneficios del procedimiento a corto y medio plazo:

Cubrir las lesiones, mejorar la vascularización y función del cuello, corregir la fístula faringocutánea.

¿Qué otras alternativas hay?

Realización de colgajos locales en aquellos casos en que sea posible.

Declaraciones y firmas

Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda sobre su enfermedad, no dude en preguntarnos. Le atenderemos con mucho gusto. Le informarnos que tiene derecho a revocar su decisión y retirar su consentimiento.

DOY MI CONSENTIMIENTO He sido informado/a suficientemente de la intervención que se me va a realizar, explicándome sus riesgos, complicaciones y alternativas, la he comprendido y he tenido el tiempo suficiente para valorar mi decisión. Por tanto, estoy satisfecho/a con la información recibida. Por ello, doy mi consentimiento para que se me realice dicha intervención por el médico responsable. Mi aceptación es voluntaria y puedo retirar este consentimiento cuando lo crea oportuno, sin que esta decisión repercuta en mis cuidados posteriores.

PACIENTE/REPRESENTANTE:	MÉDICO:
D.N.I.:	Nº Colegiado:
Fdo.:	Fdo.:

En _____, a _____ de _____ de 20____

He decidido **REVOCAR MI ANTERIOR AUTORIZACIÓN**

PACIENTE/REPRESENTANTE:	MÉDICO:
D.N.I.:	Nº Colegiado:
Fdo.:	Fdo.:

En _____, a _____ de _____ de 20____