

+Información para la realización del estudio de electroneurografía-potenciales evocados del nervio pudendo y electromiografía ano rectal+

Alcance: Pacientes que van a realizarse el estudio de electroneurografía-potenciales evocados del nervio pudendo y electromiografía ano rectal.

Objeto de la preparación:

Para una correcta exploración del canal anal y el recto se precisa la ausencia de contenido de los mismos. De esta manera se evitan posibles repeticiones de las pruebas y se mejora el diagnóstico de lesiones a esos niveles. Por ello, recomendamos que siga rigurosamente las siguientes instrucciones.

Documentos para traer el día de la exploración:

-Traiga leído y firmado el Consentimiento Informado de la exploración (el paciente y el facultativo solicitante).

-Traiga los últimos estudios de imagen.

Medicaciones:

-Si toma antiinflamatorios (aspirina, ibuprofeno, etc.), antiagregantes plaquetarios (Adiro®, etc.) o medicamentos que contengan hierro deberá preguntar a su médico tratante (quien solicita el estudio) la necesidad de suspenderlos días antes de la exploración. Si toma anticoagulantes (Sintrom®) para que este le indique claramente si debe o no suspenderlos. El día de la exploración tomará su medicación habitual salvo que su médico (médico quien solicita a prueba) le indique lo contrario.

Dieta:

En la mayor parte de los casos no será necesaria la realización de ninguna dieta.

Preparación intestinal:

Para una adecuada visualización del canal anal será precisa la preparación mediante enemas. Se deberá administrar dos enemas (Enema Casen® o similar): el primero en la tarde anterior y otro en la mañana previa a la exploración. En caso de precisar **una mayor preparación se lo indicará el médico solicitante.**

Casos especiales de preparación:

Se lo indicará el médico solicitante.

Cuidados postexploración:

Seguirá con su dieta y medicación habitual salvo que se le indique lo contrario. Si tuviera síntomas como dolor anal que no desaparece, sangrado o fiebre importantes, **acudirá al servicio de urgencias** para valorar posibles complicaciones.