






ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Darbopoetina alfa (ARANESP®) _____ µg cada _____ días.

Normas para la correcta administración:

 ARANESP® _____ mg/kg	 De sayuno	 Comida	 Cena	 ¿Cómo administrarlo? Vía subcutánea
--	---	--	--	--

Se debe administrar los días de la semana:

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
--------------	---------------	------------------	---------------	----------------	---------------	----------------

Si acude al área de enfermería, consulte a su médico o farmacéutico

Observaciones:

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Darbopoetina alfa ARANESP®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____


DARBEPOETINA ALFA (ARANESP®)

¿Qué es y para que se utiliza?


- ✳ Se utiliza para aumentar el número de glóbulos rojos.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Se administra en inyección debajo de la piel (vía subcutánea).
- ✳ Deje la jeringa fuera de la nevera, a temperatura ambiente, durante 30 minutos.
- ✳ Compruebe el aspecto de la jeringa. Debe ser un líquido transparente e incoloro.
- ✳ Lávese las manos cuidadosamente.
- ✳ Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa precargada. Debe extraer la burbuja de aire.
- ✳ Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar.
- ✳ Introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45°.



- ✳ Manteniendo la piel pellizcada presione el émbolo de forma lenta y constante.
- ✳ Una vez administrado el líquido, retire la aguja mientras mantiene la presión sobre el émbolo y deje ir la piel.
- ✳ Desinfecte la piel con alcohol.
- ✳ Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.



¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conserve las jeringas en nevera (2-8 °C). **NO CONGELAR.**

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Es muy importante acudir a las analíticas solicitadas por su médico. Controle con frecuencia su presión sanguínea. Si no se controla, avise a su médico.

- Síntomas de tipo gripal: más frecuentes al principio del tratamiento.
- Aumento de la presión arterial: dolor de cabeza, especialmente súbito y punzante, confusión. Consulte con el médico.
- Reacción alérgica generalizada: salpullido por todo el cuerpo, dificultad al respirar, pulso rápido o sudoración, suspenda la administración del fármaco y contacte con su médico.
- Alteraciones de la coagulación. El médico debe valorar la continuación del tratamiento.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Consulte con su médico u otro profesional sanitario si olvida una dosis. Nunca se administre una dosis doble para compensar.

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito.
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO

Fecha última revisión: Febrero 2014