Josis diaria:

mg al día.

Normas para la correcta administración:

Este medicamento se puede tomar con o sin alimentos.

Observaciones:

| | ¿Como administrarlo? | Tomas ೧೩೧ ರ ಽ:೧ ಡುಗೀಲಗಳುತ್ತ |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Cuándo tomar la medicación? | Cerra Cerra | |
| | CDamida | |
| | Desayum Desayum | |
| PO? | | SPRYCEL #6 UC#PR##BOS |

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO DE **FARMACIA**

Dasatinib SPRYCEL®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente:

Fecha:



PP-GHM-AC-24-07 Rev. 1

DASATINIB (SPRYCEL®)

¿Qué es y para que se utiliza?

Dasatinib es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- El medicamento puede tomarse **con o sin alimento y** debe tragarse entero con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolver.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Diarrea, náuseas.

Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas. Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Erupción cutánea, picor.

Dificultad para respirar, tos, palpitaciones.

Dolor de cabeza, mareo.

Aumento o disminución del peso,

Fatiga, cansancio. Dolor muscular y óseos.

Retención de líquidos.

Precauciones

- Si tiene una enfermedad hepática
- Si tiene una enfermedad del corazón
- Si toma omeprazol, pantoprazol... o ranitidina.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 4 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Lactancia: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con cremas con filtros físicos con protección superior a 15.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada. Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interaccionar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Las cápsulas sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO

PP-GHM-AC-24-07 Rev. 1