

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis dosis:









Le han prescrito una dosis de Lapatinib (TYVERB®) de _____ mg. Usted debe tomar _____ comprimidos 1 vez al día.

Normas para la correcta administración:

Este medicamento **no se debe tomar junto con alimentos**, por ello debe tomar el comprimido al menos, 1 hora antes o 1 después de la comida principal que usted elija.

Tome todos los comprimidos juntos (sin masticar, disolver o fraccionar) junto con un vaso de agua.

¿Cuándo tomar la medicación?

Tyverb® 250 mg 	Desayuno  1 hora antes ó 1 hora después 	Comida  1 hora antes ó 1 hora después 	Cena  1 hora antes ó 1 hora después 	¿Como administrarlo? En ayunas
Debe seleccionar una hora del día, excluyendo el horario de las comidas principales:				
Dosis		Número de Comprimidos	Hora elegida del día:	

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Lapatinib TYVERB®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

LAPATINIB (TYVERB®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Lapatinib es un medicamento indicado en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene que tomar. La dosis habitual es 1250 mg (5 comprimidos) o 1500 mg (6 comprimidos).
- ✳ Lapatinib se administra una vez al día.
- ✳ Los comprimidos deben tomarse **en ayunas**, es decir, 1 hora antes o 1 hora después de las comidas.
- ✳ Debe tomar los comprimidos que su médico le haya prescrito enteros con agua, uno tras otro, a la misma hora cada día.
- ✳ Es importante que tome todos los comprimidos que le ha pautado su médico todos los días a la misma hora en relación con las comidas.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones gastrointestinales: especialmente **diarrea** aunque también se pueden producir vómitos, dolor abdominal, llagas en la boca y/o garganta.
- ✳ Alteraciones en la piel: es frecuente que se produzca el **Síndrome de mano-pie** (enrojecimiento, dolor, picor o ampollas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies) o **exantema** (dermatitis acneiforme). Otras alteraciones frecuentes son: erupción cutánea, pérdida de pelo, sequedad en la piel y/o inflamación de las uñas.
- ✳ Alteraciones cardíacas: es poco frecuente, pero puede aparecer latidos cardíacos irregulares y tener sensación de falta de aire (disnea).
- ✳ Alteraciones generales: Fatiga, cansancio y pérdida de apetito

Precauciones.

- ✳ En el caso de que tenga diarrea, es muy importante que tome algunas precauciones:
 - ✳ Beba mucho líquido para evitar la deshidratación (agua, bebidas isotónicas, etc...).
 - ✳ Coma alimentos habituales en una dieta astringente con bajo contenido en grasas.

- ✳ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
 - ✳ Diarrea: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
 - ✳ Disnea (falta de aire) persistente y palpitations intensas
 - ✳ Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.
- ✳ Para cuidar la piel, se recomienda el **uso de cremas hidratantes (sin urea) y con protección solar**, productos hipoalergénicos y que no contengan jabón.
- ✳ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y al menos dos semanas después de la suspensión del mismo.
- ✳ **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.
- ✳ Este medicamento contiene un derivado de **almidón** (carboximetilalmidón).

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Lapatinib a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis.
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.