

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

### Dosis diaria: \_

Le han prescrito una dosis de Lenalidomida (REVLIMID®) de \_\_\_mg al día.

### Normas para la correcta administración:

El tratamiento debe tomarse con o sin alimentos, pero en caso de molestias gástricas tómelo con alimentos. Deben tragarse enteras (no abrir ni masticar), preferiblemente con agua, y a la misma hora cada día.

### ¿Cuándo tomar la medicación?



Referencia: El fármaco se suministra en discos, comprimidos o tabletas.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE  
FARMACIA

# Lenalidomida REVLIMID®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

# LENALIDOMIDA (REVLIMID®)

## ¿Qué es y para que se utiliza?

- ✦ Revlimid® está indicado para el tratamiento de distintas neoplasias.

## ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✦ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✦ Las cápsulas pueden tomarse con o sin alimentos, pero en caso de molestias gástricas tómelo con alimentos.
- ✦ Deben tragarse enteras (no abrir ni masticar), preferiblemente con agua, y a la misma hora cada día.
- ✦ Evite el contacto con la piel, y lávese las manos antes y después de cada toma.

## ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Alteraciones gastrointestinales: (diarrea, estreñimiento, náuseas...), cansancio, debilidad muscular y calambres

Alteraciones hematológicas: (disminución de glóbulos rojos y glóbulos blancos),

Otros: alteraciones del sueño, visión borrosa, erupciones cutáneas y riesgo aumentado de infecciones.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

## Precauciones

- ✦ Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de Lenalidomida. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.
- ✦ Las mujeres en edad fértil deben usar un método anticonceptivo eficaz 4 semanas antes, durante y hasta 4 semanas después del tratamiento. Si se queda embarazada, informe inmediatamente a su médico.

- ✦ Los varones que tomen Lenalidomida también deben usar métodos anticonceptivos hasta una semana después del final del tratamiento.
- ✦ Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.
- ✦ No se debe donar sangre durante el tratamiento ni en el plazo de 1 semana después de la interrupción del tratamiento.
- ✦ Se recomienda precaución al conducir o utilizar máquinas.

## ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✦ Si ha olvidado una dosis y han transcurrido menos de 12 horas desde el olvido puede tomarla. Si han transcurrido más de 12 horas debe esperar hasta la próxima toma.
- ✦ Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

## ¿Cómo se debe conservar?

- ✦ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

## Identificación

REVLIMID® 5 mg: Cápsulas blancas, marcadas con “REV 5 mg”.

REVLIMID® 10 mg: Cápsulas azul-verde/amarillo, marcadas con “REV 10 mg”.

REVLIMID® 15 mg: Cápsulas azul/blanco, marcadas con “REV 15 mg”.

REVLIMID® 25 mg: Cápsulas blancas, marcadas con “REV 25 mg”

## Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO