

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN


### Dosis diaria:


Le han prescrito Sunitinib (SUTENT®) \_\_\_mg al día durante \_\_\_ días. (Ver informe clínico).

### Normas para la correcta administración:

Las cápsulas se deben tomar con agua, con o sin alimentos.

### ¿Cuándo tomar la medicación?

☀		🌙		¿ Como administrarlo?	
Al levantarse	Desayuno	Comida	Merienda	Cena	Al Acostarse
					

**Sutent 50 mg** 

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

## UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE  
FARMACIA

# Sunitinib SUTENT®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

## SUNITINIB (SUTENT®)

### ¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Es un medicamento indicado en el tratamiento de distintas enfermedades oncológicas.

### ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis adecuada según su patología.
- ✳ Sunitinib se administra una vez al día.
- ✳ Las cápsulas deben tomarse enteras con un poco de agua. **Pueden tomarse con o sin alimentos.**

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, llagas en la garganta y/o en la boca. Pérdida de apetito.
- ✳ Alteraciones en la piel: Se puede producir una despigmentación en la piel y el cabello. También se puede producir el síndrome de mano-pie (enrojecimiento, dolor, picor o ampollas en zona de manos y pies)
- ✳ Fatiga o cansancio intenso, dolor de cabeza.
- ✳ Alteraciones en el sabor de los alimentos.
- ✳ Aumento de la presión arterial: debe controlar la tensión arterial.
- ✳ Sangrados.
- ✳ Problemas de tiroides.
- ✳ Edemas

### Precauciones

- ✳ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
    - ✳ **Diarrea**: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
    - ✳ **Fiebre**: si tiene una temperatura mayor a 38º C.
    - ✳ **Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.**
- Advierta a su médico si tiene previsto realizarse algún tratamiento dental, en especial si ha sido tratado con bifosfonatos por vía intravenosa.

- ✳ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces.
- ✳ **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Sunitinib a su hora habitual, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- ✳ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

### ¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C). Proteger del calor, la humedad y la luz.
- ✳

### Identificación



### Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**