

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

El paciente debe fijar una fecha para dejar de fumar y la dosis de inicio debe iniciarse 1 -2 semanas antes de esa fecha

Dosis de inicio: días 1-3: Vareniclina 0.5mg/24 horas

días 4-7: Vareniclina 0.5mg/12 horas

Dosis de mantenimiento: a partir del día 8: Vareniclina 1mg/12 horas

	De Espuma	Cometido	Celosa
ChamPIX 0.5 mg/24 h Dosis de Inicio: DÍAS 1-3			
ChamPIX 0.5 mg/12 h Dosis de Inicio: DÍAS 4-7			
ChamPIX 1 mg/12 h Dosis de Mantenimiento A PARTIR DEL DÍA 8			

Los comprimidos deben tragarse enteros con agua sin masticarlos ni triturarlos.

Observaciones:

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Vareniciclina CHAMPIX®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

VARENICLINA (CHAMPIX®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Vareniclina se utiliza en la deshabituación de la dependencia del tabaco en adultos.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ El paciente debe fijar una fecha para dejar de fumar y la dosis de inicio debe iniciarse 1-2 semanas antes de esa fecha

Dosis de Inicio: días 1-3: Vareniclina 0.5mg/24 horas

días 4-7: Vareniclina 0.5mg/12 horas

Dosis de Mantenimiento a partir del día 8: Vareniclina 1mg/12 horas

- ✳ La duración del tratamiento es de 12 semanas, si tras este tiempo no ha conseguido dejar de fumar consulte a su médico.
- ✳ Los comprimidos deben tragarse enteros con agua sin masticarlos ni triturarlos.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos que se pueden producir, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- ✳ Digestivos: Náuseas, vómitos, estreñimiento
- ✳ Neurológicos: Somnolencia, mareo, trastornos del gusto
- ✳ Cardiovasculares: Fibrilación auricular, palpitaciones
- ✳ Alérgicas-dermatológicas: Erupciones exantemáticas, eritema, prurito
- ✳ Generales: Aumento del apetito, insomnio

Si usted no pudiera tolerar la medicación por algún efecto adverso, pregunte a su médico para un posible ajuste de dosis.

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Precauciones

- ✳ Si durante el tratamiento aparecen síntomas depresivos debe consultar con su médico.
- ✳ Si aparece cualquier síntoma cardiovascular nuevo o existe un empeoramiento y si presenta signos y síntomas de infarto de miocardio debe solicitar atención médica inmediata.
- ✳ Tras finalizar la terapia se puede producir un aumento de la irritabilidad, ansias de fumar, depresión y/o insomnio, consulte a su médico.
- ✳ Puede producir mareos y somnolencia y por tanto puede afectar a la capacidad de conducir y de utilizar maquinaria peligrosa.
- ✳ No se dispone de datos sobre el uso de Vareniclina en mujeres embarazadas ni en periodo de lactancia por lo que no se recomienda su uso.

Identificación



Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO