

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Abiraterona (ZYTIGA®) de _____. Usted debe tomar _____ comprimidos 1 vez al día.

Normas para la correcta administración:

Este medicamento **no se debe tomar junto con alimentos**, por ello debe tomar el comprimido al menos, 1 hora antes o 2 después de la comida principal que usted elija.

Tome todos los comprimidos juntos (sin masticar, disolver o fraccionar) junto con un vaso de agua.

¿Cuándo tomar la medicación?

| | Desayuno | Comida | Cena | ¿Como administrarlo? |
|---|--|---|---|----------------------|
|  |  |  |  | Tomar SIN alimentos |

Debe seleccionar una hora del día, excluyendo el horario de las comidas principales:

| | | | | | |
|-------|---------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Dosis | 1000 mg | ➔ | Número de Comprimidos | 4 comprimidos | Hora elegida del día: |
|-------|---------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Abiraterona ZYTIGA®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

ABIRATERONA (ZYTIGA®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✳ Abiraterona es un medicamento indicado en el tratamiento de ciertos tumores de próstata.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✳ Su médico le indicará la dosis y el número de comprimidos que usted tiene que tomar. La dosis habitual es **1.000 mg/día (4 comprimidos de 250 mg)**.
- ✳ Abiraterona se toma una vez al día. Los comprimidos deben tomarse **en ayunas**, es decir, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
- ✳ Debe tomar los comprimidos enteros con agua, uno tras otro y es importante que los tome todos los días a la misma hora.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✳ Alteraciones en las pruebas hepáticas: aumento de las enzimas hepáticas y posible alteración de los valores en las analíticas.
- ✳ Alteraciones cardíacas: es poco frecuente, pero puede aparecer alteración del ritmo cardíaco, con palpitaciones, y tener sensación de falta de aire (disnea).
- ✳ Riesgo de fracturas óseas.
- ✳ Hipertensión arterial.
- ✳ Retención de líquidos en las extremidades y disminución de potasio en sangre.
- ✳ Infecciones urinarias.

Precauciones

- ✳ Evite actividades que puedan ocasionarle caídas.
- ✳ Controle su tensión arterial de forma periódica.

- ✳ Palpitaciones intensas y sensación de falta de aire. Debilidad muscular y contracciones involuntarias debidas a la disminución de potasio.
- ✳ Picor, ojos o piel amarillenta, orina oscura y dolor o malestar en la parte superior derecha del estómago.

- ✳ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento. **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.
- ✳ Interacciones: **No tome zumo de pomelo** durante el tratamiento, informe a su médico de los medicamentos y productos de herbolario (Hipérico) que esté tomando.
- ✳ Este medicamento contiene **sodio** (6,8 mg) y **lactosa** (189 mg).

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✳ Si olvida tomar Abiraterona, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.**

¿Cómo se debe conservar?

- ✳ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO