

## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

### Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Capecitabina (CAPECITABINA®) de \_\_\_\_\_ mg al día.  
Deberá tomarlo durante \_\_\_\_\_ días seguidos, cada \_\_\_\_\_ días.

### Normas para la correcta administración:

Los comprimidos se deben tomar con agua, de 20 a 30 minutos después del desayuno y la cena.

### ¿Cuándo tomar la medicación?

Desayuno	Comida	Cena	¿Como administrarlo?
			20 minutos después del desayuno y la cena

En caso de duda, consulte a su médico o farmacéutico.

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA  
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO  
DE  
FARMACIA

# Capecitabina CAPECITABINA®

## HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

## CAPECITABINA (CAPECITABINA®)

### ¿Qué es y para que se utiliza?

- \* Este medicamento se utiliza para el tratamiento de distintas enfermedades oncológicas.

### ¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- \* Su médico le indicará la dosis adecuada según su peso y altura.
- \* Capecitabina se administra dos veces al día.
- \* **Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua 20 ó 30 minutos después del desayuno y la cena.**

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- \* Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, llagas en la garganta y/o en la boca.
- \* Reacción cutánea mano-pie: Produce enrojecimiento, dolor, picor o ampollas en las palmas de las manos o en las plantas de los pies.
- \* Fatiga y/o palpitaciones.
- \* Alteraciones en el sabor de los alimentos.

### Precauciones

- \* En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:
  - \* **Diarrea**: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.
  - \* **Fiebre**: si tiene una temperatura mayor a 38º C.
  - \* **Dolor torácico**.
- \* Advierta a su médico si está tomando:

- \* Medicamentos para disminuir la coagulación de la sangre (como el Sintrom®)
- \* Medicamentos para la gota.
- \* Medicamentos para las convulsiones o temblores.
- \* Este medicamento contiene **lactosa**.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- \* Si olvida tomar Capecitabina a su hora habitual y:
  - \* han pasado menos de 6 horas: tome la dosis olvidada tan pronto como sea posible y posteriormente continúe con el horario habitual.
  - \* han pasado más de 6 horas: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento
- \* **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

### ¿Cómo se debe conservar?

- \* Conservar a temperatura ambiente (nunca superior a 30 °C)

### Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Las cápsulas sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO**