





ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito ___ µg de Filgrastim (NIVESTIM®) al día durante ___ días.

 Filgrastim	 Desayuno	 Comida	 Cena	¿Como administrarlo? Vía subcutanea		
Seleccione los días de la semana:						
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Filgrastim NIVESTIM®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

FILGRASTIM (NIVESTIM®)

¿Qué es y para que se utiliza?

Se utiliza para estimular la producción de glóbulos blancos en la médula ósea.

¿Cuál es la dosis?

La dosis recomendada es según prescripción médica.

¿CÓMO se debe administrar Filgrastim?


Filgrastim se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel).

- Deje la jeringa fuera de la nevera, a temperatura ambiente, durante 30 minutos.
- Compruebe el aspecto de la jeringa. Debe ser un líquido transparente e incoloro.
- Lávese las manos cuidadosamente.
- Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa precargada. Debe extraer la burbuja de aire.
- Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar.
- Introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45°.



- Manteniendo la piel pellizcada presione el émbolo de forma lenta y constante.
- Una vez administrado el líquido, retire la aguja mientras mantiene la presión sobre el émbolo y deje ir la piel.
- Desinfecte la piel con alcohol.

Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.



NO se debe administrar Filgrastim

- Si es alérgico a Filgrastim, así como a cualquiera de sus los componentes.
- Si es intolerante al sorbitol (un tipo de azúcar).

- Si padece el Síndrome de Kostmann o neutropenia severa congénita.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente administración y no doble nunca la dosis.

¿Cómo se debe conservar?

Mantenga las inyecciones en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°) **NO CONGELAR**.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Dolor muscular y óseo. Osteoporosis

Dolor de cabeza

Reacción en el lugar de inyección: enrojecimiento, picor, inflamación, dolor.

Cansancio, pérdida del apetito

Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea

Tos

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO