

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito una dosis de Sorafenib (NEXAVAR®) de _____ mg al día. Usted deberá tomar _____ comprimidos cada _____ horas.

Normas para la correcta administración:

Este medicamento **no se debe tomar junto con alimentos**, por ello debe tomar la medicación al menos, una hora antes o dos después del desayuno y la cena.

¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno	Comida	Cena	¿Como administrarlo?
 Nexavar 200 mg	 1 hora antes o 2 horas después	 1 hora antes o 2 horas después	 1 hora antes o 2 horas después	 

Recuerde: Si tiene cualquier duda, consulte a su médico o farmacéutico.

Observaciones:

Rev. 1

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Sorafenib NEXAVAR®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

SORAFENIB (NEXAVAR®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✖ Sorafenib es un medicamento indicado para el tratamiento de distintas enfermedades oncológicas.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✖ La dosis habitual es de 800mg al día, repartidos en dos tomas de 400 mg. Su médico le indicará la dosis adecuada de inicio de Sorafenib y podrá modificarla durante el tratamiento.
- ✖ Los comprimidos de Sorafenib **deben administrarse sin alimentos o con una comida baja en grasas**. Si tomara una comida rica en grasas, deberá tomar Sorafenib al menos 1 hora antes o 2 horas después de dicha comida.
- ✖ Los comprimidos deben ingerirse con un vaso de agua **ENTEROS**.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✖ Alteraciones gastrointestinales: especialmente diarrea aunque también se pueden producir vómitos, dolor abdominal, llagas en la garganta y/o en la boca.
- ✖ Alteraciones en la piel: Síndrome de mano-pie (enrojecimiento y/o dolor en las palmas y en las plantas de los pies), rubor, prurito (picor), pérdida de cabello y/o sequedad en la piel.
- ✖ Alteraciones en la sangre: Hipertensión (elevada presión arterial), hemorragias
- ✖ Alteraciones generales: Fatiga, pérdida de apetito, sensación de debilidad o cansancio, dolor (incluyendo dolores bucales, abdominales, óseos o cefaleas).
- ✖ Alteraciones en los resultados de las pruebas de laboratorio: bajo nivel de linfocitos, bajo nivel de fosfato en sangre y aumento de enzimas producidas por el páncreas.

Precauciones

- ✖ Se recomienda el uso de cremas hidratantes.
- ✖ Usted debería controlar su presión arterial semanalmente durante las 6 primeras semanas de tratamiento.
- ✖ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:

- ✖ **Diarrea**: si incrementa en más de 4 las deposiciones al día con respecto a sus deposiciones normales.

- ✖ **Dolor torácico o palpitations intensas**.

- ✖ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante el tratamiento y al menos dos semanas después de la suspensión del mismo.

- ✖ **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

- ✖ **Interacciones**: no tomar con zumo de pomelo. Comente a su médico el resto de medicamentos que toma, incluidos productos de herbolario como Hyperico o Hierba de San Juan.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✖ En caso de que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible siempre que no hayan pasado 6 horas y continúe con el tratamiento manteniendo el horario habitual.
- ✖ Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.
- ✖ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido**

¿Cómo se debe conservar?

- ✖ Conservar a temperatura ambiente (entre 15°C y 30°C).

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con la Unidad de Atención Farmacéutica del Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Los comprimidos sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO