








ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

Dosis diaria:

Le han prescrito Temozolomida (TEMOZOLOMIDA®) _____ mg al día. (Ver informe clínico). Tomar en ayunas (1 hora antes o 2 horas después de las comidas). Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua. No abrir las cápsulas ni masticarlas.

¿Cuándo tomar la medicación?

	Desayuno  1 hora antes o 2 horas después	Comida  1 hora antes o 2 horas después	Cena  1 hora antes o 2 horas después	¿Cómo administrarlo?
Temodal 5 mg 				En ayunas
Temodal 20 mg 				
Temodal 100 mg 				
Temodal 140 mg 				
Temodal 180 mg 				
Temodal 250 mg 				

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA
A PACIENTES EXTERNOS

SERVICIO
DE
FARMACIA

Temozolomida TEMOZOLOMIDA

®

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

Paciente: _____

Fecha: _____

HM
HOSPITALES
Somos tu Salud

TEMOZOLOMIDA (TEMOZOLOMIDA®)

¿Qué es y para que se utiliza?

- ✖ Este medicamento se utiliza para el tratamiento de distintas enfermedades oncológicas.

¿Cuál es la dosis y cómo se administra?

- ✖ Su médico le indicará la dosis adecuada en función de su peso y altura.
- ✖ Lávese las manos antes y después de manipular el medicamento.
- ✖ Use guantes y mascarilla cuando maneje este medicamento.
- ✖ **El tratamiento debe tomarse enteras (sin masticarlas, chuparlas o disolverlas) con un poco de agua.**
- ✖ Se recomienda la administración **en ayunas**. Aproximadamente 1 hora antes de que usted tenga previsto comer o dos horas después.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

- ✖ Alteraciones gastrointestinales: Náuseas, vómitos, estreñimiento y pérdida de apetito.
- ✖ Trastornos de la sangre: Disminución de glóbulos blancos (neutropenia), rojos (anemia) y plaquetas (trombopenia).
- ✖ Trastornos en la piel: Caída del cabello y/o erupciones cutáneas (puede empeorar con la exposición al sol)
- ✖ Trastornos generales: Sensación de cansancio, fatiga, somnolencia, cefaleas.
- ✖ Riesgo de infecciones: su médico le indicará si necesita tomar antibióticos profilácticos.
- ✖ Toxicidad hepática.

Precauciones

- ✖ En caso de presentar alguno de los síntomas que se detallan a continuación, deberá ponerse en contacto con su médico o acudir a un centro sanitario:

- Fiebre: si tiene una temperatura mayor a 38º C.
- Dolor de cabeza muy persistente
- Convulsiones
- Reacción alérgica grave.

- ✖ Contiene lactosa.
- ✖ Si la cápsula se estropea, evite el contacto con su piel, ojos o nariz. Si esto ocurre, lave la zona afectada con agua y jabón.
- ✖ **Embarazo**: es importante evitarlo durante el tratamiento, por lo que se deberá utilizar medidas anticonceptivas eficaces tanto en los pacientes varones (hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento) como en las mujeres
- ✖ **Lactancia**: suspenda la lactancia antes de iniciar el tratamiento.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

- ✖ Si olvida tomar Temozolomida, tome la medicación tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra ya próximo a la toma de la siguiente dosis. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar el tratamiento.
- ✖ **Nunca se tome una dosis doble para compensar un olvido.**

¿Cómo se debe conservar?

- ✖ Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30 °C).

Recomendaciones generales

- Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas aunque los síntomas sean similares.
- Informe a su médico y/o farmacéutico si está tomando otros medicamentos (incluidos los que adquiera sin receta), suplementos dietéticos o productos naturales ya que podrían interactuar con la medicación que le han prescrito
- Ante cualquier duda o si necesita información adicional, consulte con su médico o con el Servicio de Farmacia.
- No tome este medicamento una vez superada la fecha de caducidad.
- En caso de interrupción del tratamiento, no tire la medicación a la basura. Las cápsulas sobrantes serán devueltos al Servicio de Farmacia.
- Mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños.

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO